No. 49 observation sur une hernie crurale compliquée

La veuve La vigne blanchisseuse demeurante a Vanvres proche Clamart, agées d'environ 83 ans, etoit incommodée depuis huit ans d'une hernie crurale depiploon et d'intestin qui ne rentroit qu'en partie et pour la quelle elle n'avoit jamais fait usage de Bandages

le 12 may 1763 elle eprouva les simptomes de l'etranglement, tension et douleur de la Tumeur coliques dans le ventre, vomissemens et suppression des selles

pendant deux jours elle fit plusieurs tentatives inutiles pour la reduction

le 14 du dit mois elle consulta un Chirurgien qui apres une legere saignée fit appliquer des Cataplasmes emoliens sur la tumeur, fit donner des lavemens purgatifs et des potions huileuses mais sans succez

les accidents continuerent jusqu'au 22 du même mois que la malade me fit appeller a son secours

je la trouvai dans le dernier etat de foiblesse

le pouls etoit petit sans chaleur mais non concentré

le ventre etoit metorisé. La tumeur etoit de la grosseur d'une pomme de Renette, dure, renitente et douloureuse, la peau etoit enflammée,

les hoquets et les vomissemens continuoient, la malade eprouvoit des anxietés du côté de la region epigastrique

les Evacuations par le bas etoient tout a fait supprimées depuis le premier jour de l'etranglement

La Malade etoit courageuse et desiroit l'operation qui me paroissoit indispensable mais le grand age et sa foiblesse me laissoient peu d'esperance de succez

j'invitai Mr Coutavoz a venir m'aider de ses conseils l'operation fut decidée et faite au même moment

ARC 16 d. 2 n° 68

Lincision dela peau faite proportionnément au volume
dela tumeur decouvrit le sac herniaire qui etoit mince
et adherent dans sa plus grande partie a lepiploon
Laiant ouvert avec les precautions requises dans lendroit
ou il me parut navoir pas contracté d'adherences il sortit
un peu de liqueur roussatre. cette ouverture agrandie
avec lebistouri ala faveur dune sonde crenellée mit a
decouvert un paquet depiploon skirreux.
comme cet etat de lepiploon indiquoit la necessité de
le couper je ne m'amusai point a detruire les adherentes
trop intimes quil paroissoit avoir depuis longtemps avec
le sac herniaire, me proposant ~~les~~ emporter avec le sac
quand j'aurois dégagé ~~[illegible]~~ lintestin que les accidents m'avoient
annoncés faire partie dela tumeur. je cherchai alors
a le mettre a decouvert. a cet effet j'emportai avec
precaution et a differentes reprises plusieurs couches de
lepiploon dans lendroit ou il me parut moins epais
je me fis jour enfin avec beaucoup de peine jusqu'a lintestin
ala faveur de la sonde crenelée j'agrandi louverture
qui nous en laissa voir une portion pliée en anse
longue denviron six pouces, adherente en plusieurs
endroits a lepiploon qui lenvelloppoit de toutes parts
formoit une espece de second sac herniaire
je detruisi les adherences qui netoient qu'aglutinatives
partie avec les doigts partie avec le manche dun
scalpel jusque à larcade crurale. j'en fis de même
des adherences sans nombre que les circonvolutions
de lintestin avoient contractées entre ~~[illegible]~~ elles
Lintestin nous parut enflammé et fort distendu ~~gonflé~~ par les
matieres mais sans aucun signe de gangrene
je retirai au dehors les deux portions qui etoient engagées
sous larcade je les allongeai le plus quil me fut possible
pour faire passer les matieres dans une plus grande
etendue du canal et faire la reduction s'il etoit possible
sans debrider larcade

malgré ces precautions je ne pu parvenir a le reduire
ce qui me determina a debrider le ligament inguinal que
je reconnu avec le doigt former lobstacle
mais auparavant, pour me donner plus d'aisance, j'emportai
la portion de l'epiploon skirreux, avec une partie du sac
auquel je l'avois laissé adherent, le plus pres qu'il me fut
possible de l'arcade a la quelle il etoit aussi fort adherent
cependant a la faveur du doigt je trouvai un point ou avec
le bistouri ordinaire conduit dans la crenelure de la sonde
je ~~[illegible]~~ fis une incision d'environ deux lignes de dedans en dehors sans courir les risques
de le blesser. je fis alors la reduction de l'intestin avec
facilité. j'appliquai une petite pelote molette sur l'ouverture
et le reste de l'appareil comme il est d'usage
je fis faire une embrocation d'huile rosat sur le ventre
je prescrivi un lavement purgatif qui deux heures apres
l'operation entraina quelques matieres. cette evacuation
m'indiqua la necessité de profiter du moment pour
donner un minoratif qui ~~[illegible]~~ procura des evacuations
abondantes par le bas d'humeurs jaunes et foetides en
partie dures et en partie liquefiées.
le vomissement cessa le hoquet continua seulement
pendant 2 a 3 heures apres l'operation
le soir sur les dix heures je trouvai la malade fort
tranquile, le ventre etoit moins tendu et peu douloureux
le pouls etoit petit le visage pale la peau froide
et la foiblesse extrême
je prescrivi quelques ~~[illegible]~~ cordiaux et du bouillon nourisant
pour tacher de rapeller les forces de la malade mais en vain
le lendemain matin 23 du mois je la trouvai expirante
malgré l'envie que je temoignai de faire l'ouverture du
cadavre la famille ne voulu point y consentir

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

de cette observation qui n'est pas unique dans son genre,
ne pouroit on pas conclure que quoique dans les vieillards
et dans les hernies ou il entre beaucoup d'epiploon et ou
(la gangrene etant moins a craindre, on conseille de
temporiser pour l'operation, cependant il est dangereux
de trop differer parce qu'en laissant le malade s'affoibler
d'un coté par la longueur de la maladie, les souffrances
et les pertes continuelles qu'il fait par le vomissement
d'un autre par le defaut de reparation des sucs nourriciers
si utiles surtout aux vieillards, on prive la nature des
ressources necessaires pour seconder l'art dans les circonstances

---

Je pourois etaier cette observation du succez d'une
operation a peu pres de la meme nature faite aussi
en presence de Mr Coarasor quelque temps apres
a une femme de 84 ans le troisieme jour de l'etranglement
quoique les accidents ne menacassent pas d'une
gangrene prochaine cependant l'exemple de la
malade qui fait le sujet de cette observation
me determina apres avoir tenté inutilement tous
les moiens convenables pour la reduction, a ne pas
differer plus long temps l'operation
malgré cette precaution peu s'en falut que la
malade n'eut succombé à la foiblesse.

le 22 8bre 1786

Jaquer Chirurgien principal
de l'hopital general